

**Aus dem Pharmakologischen Institut der Westfälischen
Wilhelms-Universität zu Münster (Westf.)**
Direktor: Prof. Dr. med. et phil. H. Freund

**Die Wirkung einiger zyklischer und halogen-
substituierter Barbitursäureabkömmlinge
auf die Dehydrierungen.**

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der zahnmedizinischen Doktorwürde
einer Hohen Medizinischen Fakultät der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Westf.)

Vorgelegt von
Karl Walden
Zahnarzt
aus Gelsenkirchen-Horst

1 9 3 4

Druckausführung Franz Grube, Werne a. d. Lippe

Dekan : Prof. Dr. Klinge

Referent: Privatdozent Dr. med. et phil. W. Haarmann

Korreferent: Prof. Dr. med. et phil. H. Freund



Meiner lieben Braut!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Wirkung einiger zyklischer und halogensubstituierter Barbitursäureabkömmlinge auf die Dehydrierungen.

Wie eine Reihe von Untersuchungen im hiesigen Institut gezeigt haben, sind die Stoffwechselwirkungen von Barbitursäurederivaten weitgehend verschieden je nach den eingeführten Seitenketten. Vor allem nehmen eine Sonderstellung alle diejenigen Barbitursäuren ein, welche zyklische Ringe enthalten. Unter diesen und neben ihnen sind die halogensubstituierten Barbitursäurepräparate durch besonders starke Stoffwechselwirkung ausgezeichnet. Dies geht aus einer Reihe von vergleichenden Untersuchungen hervor, die mit 17 verschiedenen Barbitursäuren angestellt wurden und in denen die Milchsäurebildung aus verschiedenen Kohlehydraten in einer Reihe von Organen, ferner der Glykogenabbau, die Bildung und Spaltung der Phosphorsäureester und die Dehydrierungen untersucht wurden. Die Ergebnisse, die im Einzelnen hier nicht aufgeführt werden sollen, sind in den Dissertationen von Alten¹⁾, Brinkamp²⁾, Stracke³⁾ und Weber⁴⁾ (Milchsäurebildung), Bronstert⁵⁾, Holtkamp⁶⁾ und Röhle⁷⁾ (Spaltung und Bildung von Phosphorsäureestern), Bensch⁸⁾ und Mohnke⁹⁾ (Dehydrierungen).

Die vorliegende Arbeit hatte die Aufgabe, die Untersuchungen auf die Dehydrierungsreaktionen auszudehnen auf die Einwirkung von phenylsubstituierten und halogensubstituierten Verbindungen. Die Arbeit wurde in der im Institut üblichen Versuchsanordnung ausgeführt. Untersucht wurden folgende Barbitursäuren, die in den Tabellen durch römische Ziffern gekennzeichnet sind.

1) Alten: Inaugural-Dissertation, Münster, 1934.

2) Brinkamp: ebenda 1934.

3) Stracke: Inaugural-Dissertation, Münster, 1934.

4) Weber: ebenda.

5) Bronstert: ebenda.

6) Holtkamp: ebenda.

7) Röhle: ebenda.

8) Bensch: ebenda.

9) Mohnke: ebenda.

1. Phenylpropylbarbitursäure (XII),
2. Phenylallylbarbitursäure (XIII),
3. Phenylbenzylbarbitursäure (XIV),
- 4) p — chlorphenylallylbarbitursäure (XV),
5. β — bromisopropyl-propenylbarbitursäure (XVI) (Noctal),
6. Butylbrompropenylbarbitursäure (XVII) (Pernocton).

Die in Wasser nur wenig löslichen freien Säuren wurden durch Neutralisation mit Natronlauge wasserlöslich gemacht und in dieser Form den Versuchen zugesetzt.

Versuchsserie I.

Der Einfluß der Barbitursäuren auf das Dehydrierungsvermögen der Skelettmuskulatur vom Kaninchen ist aus den Tabellen 1 a und b ersichtlich.

Tabelle 1 a
Muskel, ohne Zusatz
Entfärbungszeit in Minuten

Barbitur- säuren	Konzentration							Tier
	0,0	1.10 ⁻⁸	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³	
XII	15	22	24	25	20	16	17	Kaninchen
	15	21	23	25	21	15	17	
XIII	15	29	28	28	18	12	11	"
	16	29	29	26	18	12	10	
XIV	16	27	19	15	20	17	16	"
	16	17	17	15	21	18	15	
XV	16	26	22	19	15	17	22	"
	16	20	23	20	16	16	21	
XVI	17	23	18	17	20	20	19	"
	16	22	18	17	21	21	20	
XVII	16	18	19	19	17	17	18	"
	16	18	20	19	16	17	19	

Tabelle 1 b
Entfärbungszeit % vom Kontrollversuch

Barbitursäuren	Konzentration					
	1.10 ⁻⁸	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³
XII	147	160	167	133	107	114
	140	154	167	154	100	114
XIII	193	187	187	120	80	72
	193	193	167	120	80	67
XIV	106	119	94	125	106	100
	100	106	94	131	113	94
XV	125	138	119	94	106	138
	125	144	125	100	100	131
XVI	135	106	100	118	118	112
	138	113	106	131	131	125
XVII	113	119	119	106	106	113
	113	125	119	100	106	119

Nach dem Verlauf der Wirkungskurve lassen sich unschwer mehrere Gruppen von Barbitursäuren unterscheiden. Die beiden phenylsubstituierten Säuren Dipropyl- und Diallylbarbitursäure (XII und XIII) verzögern die Methylenblaufärbung besonders stark in starken Verdünnungen. Bei Barbitursäure XIII liegt die stärkste Hemmung bei der größten Verdünnung, bei Barbitursäure XII bei der Konzentration 1.10^{-6} , mit ansteigender Konzentration läßt die Hemmung nach und geht bei Barbitursäure XIII in eine starke Förderung der Dehydrierungsvorgänge über; bei Barbitursäure XII tritt hier Wirkungslosigkeit ein. Die Hemmungswirkungen nehmen hier also mit der Verdünnung zu, nicht wie man erwarten sollte, mit der Konzentration.

Die halogenierten Barbitursäuren XV—XVII gehören nach ihrer Stoffwechselwirksamkeit zusammen. Die stärksten Verschlechterungen der Dehydrierungen sehen wir auch hier wie

bei den phenylsubstituierten Barbitursäuren bei niedrigen Konzentrationen (1.10^{-8} bzw. 1.10^{-7}). In mittleren Konzentrationen (1.10^{-5} bzw. 1.10^{-6}) verlaufen die Dehydrierungen normal und bei höheren Konzentrationen setzt wieder eine starke Verschlechterung ein. Bei der Benzylphenylbarbitursäure beobachten wir nur bei der Konzentration 1.10^{-5} eine stärkere Herabsetzung des Dehydrierungsvermögens; alle übrigen Konzentrationen sind nahezu wirkungslos.

Versuchsserie II.

Eine sehr wirkungsvolle Gewebsdehydrase ist die Milchsäuredehydrase, deren Beeinflussung durch die Barbitursäuren am Muskel vom Hund geprüft wurde und zwar in üblicher Weise durch Zusatz von Natriumlaktat.

Tabelle 2a
Muskel, Laktatzusatz
Entfärbungszeit in Minuten

Barbitur- säuren	Konzentration							Tier
	0,0	1.10^{-8}	1.10^{-7}	1.10^{-6}	1.10^{-5}	1.10^{-4}	1.10^{-3}	
XII	14	14	15	15	14	13	14	Hund
	15	15	16	17	15	13	14	
XIII	16	19	18	15	16	16	14	„
	16	18	17	15	15	17	16	
XIV	16	20	16	17	14	19	17	„
	16	19	17	18	15	18	16	
XV	15	21	20	13	15	20	20	„
	16	22	19	14	15	19	21	
XVI	16	22	20	17	25	27	20	„
	16	21	20	16	24	26	19	
XVII	16	21	16	19	15	14	15	„
	17	22	16	20	16	15	16	

Tabelle 2 b
Entfärbungszeit % vom Kontrollversuch

Barbitursäuren	Konzentration					
	1.10 ⁻⁸	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³
XII	100	107	107	100	93	100
	100	107	113	100	87	93
XIII	119	113	94	100	100	88
	113	106	94	94	106	100
XIV	125	100	106	88	119	106
	119	106	113	94	113	100
XV	140	133	87	100	133	133
	138	119	88	94	119	131
XVI	138	125	106	156	169	125
	131	125	100	150	163	119
XVII	131	100	119	94	88	94
	130	94	118	94	88	94

Aus den Tabellen 2 a und b geht hervor, daß die Dehydrierung der Milchsäure nur von den halogensubstituierten Barbitursäuren stark verändert wird, besonders stark durch das Noctal (XVI). Mittlere Konzentrationen (1.10^{-6} bzw. 1.10^{-5}) sind ohne Einwirkungen; starke Verdünnungen und hohe Konzentrationen verzögern die Dehydrierung der Milchsäure. Bei Barbitursäure XV liegt die stärkste Hemmung bei der höchsten und niedrigsten Konzentration, bei Noctal bei der Konzentration 1.10^{-4} . Das Pernocton (XVII) verhält sich etwas anders, es beschleunigt in hohen Konzentrationen die Methylenblaufärbung, wenn auch nur unerheblich. Die phenylsubstituierten Barbitursäuren XII—XIV sind praktisch ohne Einwirkung, leichte Hemmungen sind besonders bei starken Verdünnungen nachweisbar.

Versuchsserie III.

Der Glykogenabbau verläuft im großen und ganzen ungestört, wenn wir von gewissen Konzentrationen einiger Schlafmittel absehen. Es sind das besonders die Konzentrationen 1.10^{-4} bei den phenylsubstituierten Barbitursäuren XII und XIII und der Konzentration 1.10^{-7} beim Pernocton.

Der Abbau des Glykogens durch Dehydrierung beginnt nicht am intakten Molekül, sondern erst nachdem das Glykogen zu dehydrierbaren Verbindungen abgebaut ist. Es sind das keine Zucker mehr, sondern Spaltungsprodukte der Zucker mit drei Kohlenstoffatomen, die man als Triosen bezeichnet.

Tabelle 3 a
Muskel, Glykogenzusatz
Entfärbungszeit in Minuten

Barbitur- säuren	Konzentration							Tier
	0,0	1.10^{-8}	1.10^{-7}	1.10^{-6}	1.10^{-5}	1.10^{-4}	1.10^{-3}	
XII	15	15	18	14	17	18	17	Hund
	15	16	17	15	16	19	18	
XIII	15	14	13	15	16	18	16	"
	15	15	14	16	17	19	16	
XIV	16	17	18	16	16	18	20	"
	16	16	18	16	15	18	19	
XV	15	14	16	13	14	17	16	"
	15	15	16	13	15	16	16	
XVI	16	15	14	15	14	19	17	"
	16	15	15	16	14	18	16	
XVII	15	18	18	16	17	15	15	"
	15	17	18	17	17	16	15	

Tabelle 3 b
Entfärbungszeit % vom Kontrollversuch

Barbitursäuren	Konzentration					
	1.10 ⁻⁸	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³
XII	100	120	93	113	120	113
	106	113	100	106	127	120
XIII	93	87	100	106	120	106
	100	93	106	113	127	106
XIV	106	112	100	100	112	125
	100	112	100	94	112	119
XV	93	107	87	93	113	107
	100	107	87	100	107	107
XVI	94	88	94	88	119	106
	94	94	100	88	113	100
XVII	120	120	107	114	100	100
	114	120	114	114	107	100

Versuchsserie IV.

Zu den folgenden Versuchen Tabelle 4 a und b wurde stark mit Wasser ausgewaschene Skelettmuskulatur vom Kaninchen verwendet. Derart vorbehandeltes Gewebe enthält keine Nährstoffe mehr, kann daher Methylenblau auch nicht entfärben. Werden dem Gewebe dehydrierbare Substanzen zugesetzt, deren abbauende Fermente trotz Auswaschens mit Wasser im Gewebe erhalten geblieben sind, so läßt sich der Abbau dieser Verbindungen ohne störende Nebenreaktionen zeigen. Es wurde zunächst die Dehydrierung von Bernsteinsäure durch Zusatz von bernsteinsaurem Natrium untersucht. Es bildet sich hierbei aus der Bernsteinsäure unter Abspaltung von zwei Wasserstoffatomen Fumarsäure nach folgender Formel:



Allen Barbitursäuren gemeinsam ist, daß sie die Dehydrierungen der Bernsteinsäure bei der Konzentration 1.10⁻⁶ — beim Noctal

bei $1 \cdot 10^{-7}$ — am stärksten verzögern. Im sonstigen sind alle Konzentrationen der Schlafmittel, abgesehen von wenigen Ausnahmen, ohne Einfluß. Die Abweichungen der Entfärbungszeit liegen innerhalb der Fehlergrenzen der Methodik (± 1 Minute) beim Kontrollversuch.

Tabelle 4 a
Muskel, Bernsteinsäurezusatz
Entfärbungszeit in Minuten

Barbitur- säuren	Konzentration							Tier
	0,0	$1 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-3}$	
XII	16	17	19	21	19	19	17	Kaninchen
	17	18	20	21	20	19	18	
XIII	20	18	19	23	20	19	23	„
	20	19	19	21	20	18	20	
XIV	18	16	17	22	19	18	19	„
	18	16	18	23	20	19	21	
XV	19	20	22	22	20	19	19	„
	19	20	21	22	19	18	20	
XVI	20	18	24	21	22	18	17	„
	20	19	22	20	23	19	17	
XVII	18	16	18	25	23	18	19	„
	19	17	18	22	21	19	20	

Versuchsserie V.

Stärkere Einwirkungen beobachten wir beim Abbau der Hexosediphosphorsäure (Tabelle 5 a und b) gleichfalls durch ausgewaschene Skelettmuskulatur. Besonders wirksam ist die Barbitursäure XV mit Chlor im Molekül. Stärkste Hemmung bei der stärksten Verdünnung, das Gleiche gilt für das Pernoc-ton. Beschleunigung der Methylenbautenfärbung wird in keinem Fall beobachtet, sondern nur Hemmungen.

Tabelle 4 b
Entfärbungszeit % vom Kontrollversuch

Barbitursäuren	Konzentration					
	1.10 ⁻⁸	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³
XII	106	119	131	119	119	106
	106	118	124	118	112	106
XIII	90	95	115	100	95	115
	95	95	105	100	90	100
XIV	89	95	122	106	100	106
	89	100	128	111	106	117
XV	106	116	116	106	100	100
	106	111	116	100	95	106
XVI	90	120	105	110	90	85
	95	110	100	115	95	85
XVII	89	100	139	128	100	106
	90	95	116	111	100	106

Versuchsserie VI.

Für die bisher beschriebenen Versuche diente Skelettmuskulatur als Material, in folgenden Versuchen wurde das Dehydrierungsvermögen von Lebergewebe geprüft, das auf Gifte in anderer Weise anspricht wie Skelettmuskelgewebe, weil die fermentativen Vorgänge in diesen beiden Organen stark voneinander abweichen.

Während im Skelettmuskelgewebe (Tab. 1) die Hemmungen der Dehydrierungen durch die Schlafmittel die Regel sind, ist im Lebergewebe (Tabelle 6 a und b) entweder kein Einfluß der Barbitursäuren feststellbar oder aber die Dehydrierungen verlaufen z. T. stark beschleunigt. Das ist besonders unter dem Einfluß der Benzylphenylbarbitursäure der Fall. Gleich wirksam sind die Konzentrationen 1.10⁻⁷ und 1.10⁻³ und 1.10⁻⁸ und 1.10⁻⁴. Die Entfärbungszeit beträgt bei 1.10⁻⁷ und 1.10⁻³ zweidrittel des

Tabelle 5 a
Muskel, Hexosediphosphorsäurezusatz
Entfärbungszeit in Minuten

Barbitur- säuren	Konzentration							Tier
	0,0	1.10^{-8}	1.10^{-7}	1.10^{-6}	1.10^{-5}	1.10^{-4}	1.10^{-3}	
XII	16 16	19 18	18 17	20 19	17 16	18 18	17 18	Kaninchen
XIII	15 16	16 16	17 16	16 15	20 19	19 18	18 18	"
XIV	15 15	17 18	18 18	15 16	15 15	17 18	19 19	"
XV	17 16	25 24	25 25	22 23	21 21	20 20	22 22	"
VVI	17 17	19 20	18 19	20 21	22 20	20 20	18 19	"
XVII	17 18	23 24	22 23	19 20	19 19	20 20	22 21	"

Tabelle 5 b
Entfärbungszeit % vom Kontrollversuch

Barbitursäuren	Konzentration					
	1.10^{-8}	1.10^{-7}	1.10^{-6}	1.10^{-5}	1.10^{-4}	1.10^{-3}
XII	119 113	113 106	125 119	106 100	113 113	106 113
XIII	107 100	113 100	106 119	133 94	127 113	120 113
XIV	113 120	120 120	100 107	100 100	113 120	127 127
XV	147 150	147 156	129 144	124 131	118 125	129 137
XVI	112 118	106 112	118 124	129 118	118 118	106 112
XVII	135 133	129 128	112 111	112 106	118 111	129 117

Kontrollversuchs, d. h. das Dehydrierungsvermögen ist nur um 35 % gesteigert. Barbitursäure XV und XVI sind vollkommen wirkungslos, desgleichen das Pernocton mit Ausnahme der Konzentration 1.10^{-4} , die die Dehydrierung in der Leber mittelstark herabsetzt, wie wir auch für Barbitursäure XII nur Hemmungen beobachten. Das entgegengesetzte Verhalten von Leber- und Muskelgewebe zeigt sich besonders deutlich bei Barbitursäure XIII und zwar nur bei den stärkeren Verdünnungen. So ist bei 1.10^{-8} das Dehydrierungsvermögen des Skelettmuskels 93 % herabgesetzt, der Leber dagegen um 29 % gesteigert. In hohen Konzentrationen verkürzt die gleiche Barbitursäure in beiden Organen die Entfärbungsdauer des Methylenblaus um den gleichen Betrag.

Tabelle 6 a
Leber
Entfärbungszeit in Minuten

Barbitur- säuren	Konzentration							Tier
	0,0	1.10^{-8}	1.10^{-7}	1.10^{-6}	1.10^{-5}	1.10^{-4}	1.10^{-3}	
XII	14	16	16	17	15	13	15	Kaninchen
	14	15	16	18	15	14	16	
XIII	20	14	15	23	20	18	15	„
	21	15	16	22	18	17	16	
XIV	23	18	15	22	20	17	15	„
	23	18	15	20	19	17	15	
XV,	20	20	19	20	21	21	17	„
	20	20	19	20	22	21	17	
XVI	19	18	17	20	18	20	17	„
	19	18	18	19	17	21	16	
XVII	19	20	21	18	20	24	18	„
	19	21	22	19	21	24	20	

Tabelle 6b
Entfärbungszeit % vom Kontrollversuch

Barbitursäuren	Konzentration					
	$1 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-3}$
XII	115	115	122	107	93	107
	107	115	129	107	100	115
XIII	70	75	115	100	90	75
	72	76	105	86	81	76
XIV	78	65	96	87	74	65
	78	65	87	83	74	65
XV	100	95	100	105	105	85
	100	95	100	110	105	85
XVI	95	90	105	95	105	90
	95	95	100	90	111	84
XVII	105	111	95	105	126	95
	111	116	100	111	126	105

Versuchsserie VII.

Der Einfluß der Barbitursäuren auf den Abbau der Glukose wurde an zwei Organen geprüft und zwar zunächst am Herzmuskel (Tabelle 7 a und b) und am Hirngewebe (Tabelle 8 a und b). Das geschah deshalb, weil der Glukoseabbau Mechanismus in diesen beiden Organen verschieden ist. Im ersten Fall ist Phosphat für den Abbau notwendig, im zweiten Falle nicht.

Allen Barbitursäuren gemeinsam ist die verbessernde Wirkung auf den Glukoseabbau durch Herzmuskelgewebe. Eine Ausnahme machen lediglich die stärkeren Verdünnungen von Barbitursäuren XII und XV, die hier stark verschlechternd wirken, in mittleren Konzentrationen ($1 \cdot 10^{-6}$ und $1 \cdot 10^{-5}$) wie auch Barbitursäure XIV wirkungslos sind. Der Glukoseabbau wird durch die Barbitursäuren zumeist nicht unerheblich beschleunigt, die Steigerungen betragen bis zu annähernd 40 %.

Tabelle 7 a
Herz, Glukosezusatz
Entfärbungszeit in Minuten

Barbitur- säuren	Konzentration							Tier
	0,0	1.10^{-8}	1.10^{-7}	1.10^{-6}	1.10^{-5}	1.10^{-4}	1.10^{-3}	
XII	21	21	30	22	22	20	16	Rind
	20	20	28	23	22	20	18	
XIII	21	20	18	14	14	15	16	"
	21	19	17	18	14	14	15	
XIV	23	20	20	23	23	22	20	"
	23	22	21	24	23	21	20	
XV	24	30	28	26	26	21	21	"
	24	29	28	27	25	23	21	
XVI	24	20	20	17	16	18	15	"
	24	20	19	18	16	18	16	
XVII	22	18	15	19	16	19	21	"
	23	19	16	18	17	18	20	

Tabelle 7 b
Entfärbungszeit % vom Kontrollversuch

Barbitursäuren	Konzentration					
	1.10^{-8}	1.10^{-7}	1.10^{-6}	1.10^{-5}	1.10^{-4}	1.10^{-3}
XII	100	143	105	105	95	76
	100	140	115	110	100	90
XIII	95	86	67	67	71	76
	90	81	86	67	67	71
XIV	87	87	100	100	96	87
	96	92	105	100	92	87
XV	125	117	108	108	87	87
	121	117	112	104	96	87
XVI	83	83	71	67	75	62
	83	79	75	67	75	67
XVII	82	68	86	73	86	95
	83	70	78	74	78	87

Tabelle 8 a
Hirn, Glukosezusatz
Entfärbungszeit in Minuten

Barbitur- säuren	Konzentration							Tier
	0,0	1.10^{-8}	1.10^{-7}	1.10^{-6}	1.10^{-5}	1.10^{-4}	1.10^{-3}	
XII	26 25	30 29	28 28	29 29	35 33	30 30	34 32	Rind
XIII	22 24	22 23	22 22	21 22	24 24	22 22	20 20	"
XIV	24 24	25 26	28 27	22 24	22 22	24 23	25 24	"
XV	23 24	23 25	24 24	25 26	23 23	20 20	20 22	"
XVI	24 24	24 25	24 23	23 23	23 24	24 25	25 26	"
XVII	23 23	28 28	27 28	28 27	27 26	26 25	25 24	"

Tabelle 8 b
Entfärbungszeit % vom Kontrollversuch

Barbitursäuren	Konzentration					
	1.10^{-8}	1.10^{-7}	1.10^{-6}	1.10^{-5}	1.10^{-4}	1.10^{-3}
XII	115 116	108 112	111 116	135 132	115 120	131 128
XIII	100 96	100 92	96 92	109 100	100 92	91 83
XIV	104 108	117 113	92 100	92 92	100 96	104 100
XV	100 104	105 100	109 108	100 92	87 83	87 92
XVI	100 104	100 96	95 96	96 100	100 104	104 108
XVII	122 122	117 122	122 117	117 113	113 109	109 104

Ein ganz anderes Bild ergibt die Untersuchung des Glukoseabbaus durch Hirngewebe. Alle Barbitursäuren mit Ausnahme des Pernoctons und der Dipropylbarbitursäure (XII) sind wirkungslos. Bei den beiden letztgenannten Verbindungen finden wir die Methylenblauentfärbung verzögert, am stärksten bei Barbitursäure XII mit der Konzentration $1 \cdot 10^{-5}$.

Zusammenfassung.

Die Schlafmittel der Barbitursäurereihe — untersucht wurden phenyl- und halogensubstituierte Verbindungen —, wirken stark auf die Dehydrierungsvorgänge im Gewebe ein. Der Abbau der Glukose durch Herzmuskelgewebe wird durch die Barbitursäuren stark beschleunigt, durch Hirngewebe dagegen mit Ausnahme von Dipropylbarbitursäure und Pernocton nicht beeinflusst. Die Dehydrierungsvorgänge in der Leber werden mit Ausnahme der Diallyl- und Benzylphenylbarbitursäure nicht verändert. Diese beiden Verbindungen beschleunigen die Dehydrierungen. Die Dehydrierungsvorgänge im Skelettmuskel werden verlangsamt, besonders stark durch die phenylsubstituierten Barbitursäuren, die eine Propyl- und Allylgruppe enthalten. Die stärkste Hemmung liegt hier bei der stärksten Verdünnung, bei den übrigen Barbitursäuren sind mittlere Konzentrationen wirkungslos, während hohe Konzentrationen und starke Verdünnungen gleich stark hemmen.

Lebenslauf.

Am 22. Oktober 1907 wurde ich, Karl Walden, in Klein-Jerutten in Ostpreußen geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in Gelsenkirchen-Horst ging ich auf die Oberrealschule in Gelsenkirchen-Buer über. Im Jahre 1929 bestand ich an derselben Anstalt das Abitur. Ich studierte danach in Münster zwei Semester evangelische Theologie. Im Sommersemester 1930 begann ich das Studium der Zahnmedizin. Nach drei Semestern legte ich in Münster das Physikum ab. Dann studierte ich ein Semester in Wien, um nach weiteren drei Semestern in Münster, im November 1933, mein Staatsexamen zu bestehen.